


Utilisation des comprimés d'iode en cas d'accident nucléaire



Mode d'emploi

Le comprimé se prend dissous dans une boisson (eau, lait, jus de fruits).



Les jeunes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont les plus sensibles, leur protection est prioritaire.

Le comprimé d'iode est un médicament : lisez attentivement la notice avant de l'absorber.


Pasologie

(pour les nouveaux comprimés d'iode de potassium dosés à 65 mg)

0 à 1 mois



1 mois à 3 ans



3 à 12 ans



plus de 12 ans




En cas d'accident nucléaire, le comprimé d'iode doit être pris sur instruction du préfet.

En cas d'accident nucléaire

Dès l'alerte, il faut :

- rentrer chez soi ou rester à l'intérieur d'un bâtiment,
- écouter la radio et suivre les consignes du préfet,
- garder les comprimés d'iode à portée de main : le préfet peut vous demander d'en absorber.



En cas d'accident nucléaire, des rejets d'iode radioactif dans l'air peuvent se produire.

L'iode radioactif porte atteinte à la santé de la population, en particulier des plus jeunes.

Les comprimés d'iode stable (iodure de potassium) protègent la glande thyroïde contre les effets de l'iode radioactif.

Les comprimés d'iode sont efficaces durant 24 heures.

Pour en savoir plus :
www.asn.fr

Création Transylvanie • Illustrations Santiago Bordoli • Mars 2009